

Normtal 2007

Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning – 2007, 30 sider.

http://www.agrsci.dk/ny_navigation/institutter/institut_for_husdyrbiologi_og_sundhed/husdyrernaering_og_miljoe/normtal

Slagtesvin, 1 stk. produceret,
74 kg tilvækst
(31 kg til 105 kg levende vægt =
31 kg til 79 kg slagtevægt)

Forudsætninger:
Tilvækst 74 kg
FE_s pr. kg tilvækst 2,85 FE_s
Råprotein pr. FE_s 154,8 g
Fosfor pr. FE_s 4,5 g

Ab dyr, udskilt i alt:
Mængde 0,46 ton
N 3,03 kg
P 0,54 kg
K 1,31 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Delvis spaltegulv (50-75% fast gulv)	Gylle	0,50	6,6	2,75	2,06	0,54	1,35	5,47	4,10	1,08	2,69
Delvis spaltegulv (25-49% fast gulv)	Gylle	0,50	6,6	2,67	2,00	0,54	1,35	5,31	3,98	1,08	2,69
Fuldspaltegulv	Gylle	0,50	6,1	2,49	1,86	0,54	1,31	4,92	3,69	1,07	2,60
Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	0,50	6,1	2,56	1,92	0,54	1,31	5,08	3,81	1,07	2,60
Fast gulv	Staldgødning	0,10	23,0	1,10	0,39	0,50	0,86	11,36	3,98	5,11	8,91
	Ajle	0,33	2,0	0,99	0,89	0,05	0,61	3,04	2,74	0,16	1,88
Opdelt lejeareal	Dybstrøelse	0,09	33,0	1,02	0,25	0,29	1,10	11,95	2,99	3,43	12,89
	Gylle	0,31	4,9	1,31	0,98	0,27	0,66	4,17	3,13	0,86	2,09
Dybstrøelse	Dybstrøelse	0,17	33,0	2,03	0,51	0,58	2,19	11,95	2,99	3,43	12,89

Korrektion for afvigende vægtinterval:

Der korrigeres med følgende faktor:

for kvælstof: (slutvægt – startvægt) x (13,71 + 0,2006 x (slutvægt + startvægt))/3033

for fosfor: (slutvægt – startvægt) x (5,59 + 0,0128 x (slutvægt + startvægt))/542

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres med følgende faktor:

((kg foder pr. produceret gris x kg N pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst))/3,033

eller ((FE_{sv} pr. produceret svin x g råprotein pr. FE_{sv} /6250) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst))/3,033

Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres med følgende faktor:

((kg foder pr. produceret gris x kg P pr. kg foder) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst))/0,542

eller ((FE_{sv} pr. produceret svin x g fosfor pr. FE_{sv}/1000) - ((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg tilvækst))/0,542

1 årssso med 25,6 grise til 7,3 kg

Normalt fordeler foderforbruget fra en årssso sig med 70% i løbe- og drægtighedsstalden og 30% i farestalden.

Gødningsproduktionen er derfor opdelt på et bidrag fra løbe- og drægtighedsstalden og et bidrag fra farestalden. De to bidrag adderes for at få produktionen fra 1 årssso.

Forudsætninger:

FE _s pr. årssso	1470
Råprotein pr. FE _s	139,5 g
Fosfor pr. FE _s	5,0 g
Fravænningsalder	28 dage

Ab dyr (total),**udskilt pr. årssso:**

Mængde	3,78 ton
N	26,0 kg
P	5,66 kg
K	9,70 kg

Bidrag fra løbe-/drægtighedsstalden:

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	3,85	4,5	16,12	12,09	3,96	6,79	4,19	3,14	1,03	1,76
Individuel opstaldning, fuld-spaltegulv	Gylle	3,85	4,5	15,32	11,49	3,96	6,79	3,98	2,98	1,03	1,76
Individuel opstaldning, fast gulv	Staldgødning	0,51	23,0	5,12	1,79	2,87	4,08	10,11	3,54	5,67	8,06
	Ajle	1,68	2,5	8,28	7,45	1,12	3,46	4,94	4,45	0,67	2,06
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse	0,67	33,0	4,90	1,23	1,47	5,75	7,33	1,83	2,19	8,60
	Gylle	2,11	5,5	10,53	7,90	2,65	4,55	4,99	3,74	1,26	2,15
Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	1,77	33,0	14,38	3,60	4,37	15,82	8,12	2,03	2,47	8,93
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse	0,67	33,0	4,90	1,23	1,47	5,75	7,33	1,83	2,19	8,60
	Gylle	2,11	5,5	10,26	7,70	2,65	4,55	4,86	3,65	1,26	2,15
Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	4,57	4,5	15,88	11,91	3,98	7,29	3,48	2,61	0,87	1,60

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. årssso} \times \text{kg N pr. kg foder}) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))/26,03$

eller $((\text{FE pr. årssso} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))/26,03$

Korrektion af fosformængde ved afvigende fodermængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. årssso} \times \text{kg P pr. kg foder}) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,005 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))/5,65$

eller $((\text{FE pr. årssso} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssso} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,005 \text{ kg P pr. kg tilvækst}))/5,65$

Bidrag fra farestalden:

Mængden af lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Kassestier, delvis spal- tegulv	Gylle	1,65	4,5	6,91	5,18	1,70	2,91	4,19	3,14	1,03	1,76
Kassestier, fuldspalte- gulv	Gylle	1,65	4,5	6,16	4,62	1,70	2,91	3,73	2,80	1,03	1,76
Løsdrift, fast gulv	Staldgødning	0,36	23,0	3,11	1,09	1,35	2,64	8,75	3,06	3,80	7,43
	Ajle	0,57	2,6	2,62	2,35	0,40	1,40	4,61	4,15	0,70	2,46
Løsdrift, delvis spalte- gulv	Staldgødning	0,07	23,0	1,80	0,63	0,55	0,82	26,31	9,21	7,96	11,91
	Gylle	0,84	5,9	4,51	3,39	1,14	1,95	5,35	4,01	1,35	2,31
Friland, drægtigheds- stald	Dybstrøelse	1,62	33,0	15,36	3,84	4,78	15,33	9,48	2,37	2,95	9,46
Friland, fareperiode		1,23	2,3	8,68	0,00	1,89	3,18	7,03	0,00	1,53	2,58

Rettet den 17-09-07

1 smågris, 7,3 - 31 kg

Forudsætninger:

Tilvækst	23,7 kg
FE _s pr. kg tilvækst	2,03
Råprotein pr. FE _s	159,5 g
Fosfor pr. FE _s	5,4 g

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	0,095 ton
N	0,51 kg
P	0,14 kg
K	0,28 kg

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	0,134	5,0	0,47	0,36	0,14	0,30	3,53	2,65	1,07	2,21
Fuldspaltegulv	Gylle	0,129	4,6	0,42	0,32	0,14	0,28	3,30	2,47	1,12	2,21
Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	0,134	4,4	0,44	0,33	0,14	0,28	3,24	2,43	1,07	2,12
Fast gulv	Staldgødning	0,018	23,0	0,20	0,07	0,12	0,19	10,68	3,74	6,63	10,16
	Ajle	0,073	1,9	0,13	0,12	0,02	0,13	1,80	1,62	0,33	1,78
Dybstrøelse	Dybstrøelse	0,026	33,0	0,31	0,08	0,15	0,45	11,85	2,96	5,71	16,90

Korrektion for afvigende vægtinterval:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

for kvælstof: $(\text{slutvægt} - \text{startvægt}) \times (13,71 + 0,2006 \times (\text{slutvægt} + \text{startvægt})) / 507$

for fosfor: $(\text{slutvægt} - \text{startvægt}) \times (5,59 + 0,0128 \times (\text{slutvægt} + \text{startvægt})) / 144$

Korrektion af kvælstofmængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. produceret gris} \times \text{kg N pr. kg foder}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,507$

eller $((\text{FE}_{sv} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FE}_{sv} / 6250 - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,507$

Korrektion af fosformængde ved afvigende foder mængde og -sammensætning:

Der korrigeres relativt med følgende faktor:

$((\text{kg foder pr. produceret gris} \times \text{kg produceret gris} \times \text{kg P pr. kg foder}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,144$

eller $((\text{FE}_{sv} \text{ pr. produceret gris} \times \text{g P pr. FE}_{sv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{fravænningsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,144$

1 årsko, tung race

Forudsætninger:

Mælkeydelse, kg mælk/årsko	9093
Mælkeprotein, kg/årsko	306
Mælkeprotein, %	3,37
FE pr. årsko	6596

Råprotein pr. FE	177
Ford. råprotein, g pr. FE	133
Fosfor, g pr. FE	4,4
Fodereffektivitet, %	84,5

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	19,8 ton
N	137,4 kg
P	20,0 kg
K	114,6 kg

Mængden ab lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning		Staldgødning	10,65	20,0	65,85	16,46	18,26	33,68	6,18	1,55	1,71	3,16
		Ajle	10,49	3,4	54,54	49,08	1,97	86,42	5,20	4,68	0,19	8,24
Bindestald m. riste		Gylle	19,53	12,1	132,53	79,52	20,23	120,10	6,78	4,07	1,04	6,15
Sengestald m. fast gulv		Gylle	22,95	10,3	122,62	73,57	20,23	120,10	5,34	3,21	0,88	5,23
Sengestald m. spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)		Gylle	22,95	10,3	128,56	77,14	20,23	120,10	5,60	3,36	0,88	5,23
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, bagskyl)		Gylle	22,95	10,3	125,26	75,16	20,23	120,10	5,46	3,28	0,88	5,23
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m ringkanal)		Gylle	22,95	10,3	125,26	75,16	20,23	120,10	5,46	3,28	0,88	5,23
Sengestald m. præfabrikeret drænet gulv		Gylle	22,95	10,3	130,54	78,33	20,23	120,10	5,69	3,41	0,88	5,23
Sengestald m. fast gulv. 2% hældning. Skrabning hver 2. time		Gylle	22,95	10,3	130,54	78,33	20,23	120,10	5,69	3,41	0,88	5,23
Sengestald m. fast gulv. 2% hældning. Dræn i side. Skrabning hver 2. time		Gylle	22,95	10,3	127,90	76,74	20,23	120,10	5,57	3,34	0,88	5,23
Dybstrøelse (hele arealet)		Dybstrøelse	15,21	30,0	143,65	28,73	22,51	169,53	9,45	1,89	1,48	11,15
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv		Dybstrøelse	12,09	28,7	90,41	18,08	14,10	114,54	7,48	1,50	1,17	9,47
		Gylle	11,65	6,9	48,32	28,99	7,99	45,84	4,15	2,49	0,69	3,93
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)		Dybstrøelse	12,09	28,7	90,41	18,08	14,10	114,54	7,48	1,50	1,17	9,47
		Gylle	11,65	6,9	50,43	30,26	7,99	45,84	4,33	2,60	0,69	3,93
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)		Dybstrøelse	12,09	28,7	90,41	18,08	14,10	114,54	7,48	1,50	1,17	9,47
		Gylle	11,65	6,9	49,60	29,62	7,99	45,84	4,24	2,54	0,69	3,93
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)		Dybstrøelse	12,09	28,7	90,41	18,08	14,10	114,54	7,48	1,50	1,17	9,47
		Gylle	11,65	6,9	49,60	29,62	7,99	45,84	4,24	2,54	0,69	3,93
Trædeudmugning		Gylle	31,67	11,0	131,04	78,62	21,03	137,49	4,14	2,48	0,66	4,34

For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 9093 kg mælk pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,6 % af kvælstoffet og fosforet i gødningen.

Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, foder mængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk}/638) - 1,7)/137,4$

Korrektion for P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P}/\text{FE}/1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00096) - 0,5)/20,0$

1 årsko, Jersey

Forudsætninger:

Mælkeydelse, kg mælk/årsko	6436	Råprotein, g pr. FE	177
Mælkeprotein, kg/årsko	261	Ford. råprotein, g pr. FE	133
Mælkeprotein, %	4,06	Fosfor, g pr. FE:	4,4
FE pr. årsko	5554	Fodereffektivitet, %	86,0

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	16,5 ton
N	115,4 kg
P	17,3 kg
K	98,5 kg

Mængden ab lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning		8,86	20,0	55,31	13,83	15,91	28,49	6,24	1,56	1,80	3,22
		Ajle	8,72	3,4	45,79	41,21	1,63	74,57	5,25	4,73	0,19	8,55
Bindestald m. riste	Gylle		15,73	12,5	111,29	66,78	17,54	103,06	7,08	4,25	1,12	6,55
Sengestald m. fast gulv	Gylle		19,09	10,3	102,97	61,78	17,54	103,06	5,39	3,24	0,92	5,40
Sengestald m. spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)	Gylle		19,09	10,3	107,96	64,78	17,54	103,06	5,66	3,39	0,92	5,40
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, bagskyl)	Gylle		19,09	10,3	105,19	63,11	17,54	103,06	5,51	3,31	0,92	5,40
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m ringkanal)	Gylle		19,09	10,3	105,19	63,11	17,54	103,06	5,51	3,31	0,92	5,40
Sengestald m. præfabrikeret drænet gulv	Gylle		19,09	10,3	109,63	65,78	17,54	103,06	5,74	3,45	0,92	5,40
Sengestald m. fast gulv. 2% hældning. Skrabning hver 2. time	Gylle		19,09	10,3	109,63	65,78	17,54	103,06	5,74	3,45	0,92	5,40
Sengestald m. fast gulv. 2% hældning. Dræn i side. Skrabning hver 2. time	Gylle		19,09	10,3	107,41	64,45	17,54	103,06	5,63	3,38	0,92	5,40
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse		12,67	30,0	120,53	24,11	19,44	144,25	9,52	1,90	1,54	11,39
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse		9,83	28,5	75,33	15,07	12,09	95,71	7,66	1,53	1,23	9,73
	Gylle		10,29	6,5	40,58	24,35	6,93	39,39	3,95	2,37	0,67	3,83
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse		9,83	28,5	75,33	15,07	12,09	95,71	7,66	1,53	1,23	9,73
	Gylle		10,29	6,5	42,36	25,41	6,93	39,39	4,12	2,47	0,67	3,83
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse		9,83	28,5	75,33	15,07	12,09	95,71	7,66	1,53	1,23	9,73
	Gylle		10,29	6,5	41,47	24,88	6,93	39,39	4,03	2,42	0,67	3,83
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse		9,83	28,5	75,33	15,07	12,09	95,71	7,66	1,53	1,23	9,73
	Gylle		10,29	6,5	41,47	24,88	6,93	39,39	4,03	2,42	0,67	3,83
Trædeudmugning	Gylle		25,91	11,0	109,75	65,85	18,18	116,79	4,24	2,54	0,70	4,51

For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 6436 kg mælk pr. årsko, tillægges eller fratrækkes 0,9% af kvælstoffet og fosforet i gødningen.

Korrektion af N-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \% \text{ protein i mælk}/638) - 1,0)/115,4$.

Korrektion af P-mængde ved afvigende ydelse, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P}/\text{FE}/1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00108) - 0,3)/17,3$

Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalve, tung race.
 Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt
 (småkalve) er beregnet på baggrund af 365
 foderdage

Forudsætninger:

	Tung race	Jersey
Antal FE	874	655
Råprotein, g pr. FE	199	199
Ford. råprotein, g pr. FE	152	152
Fosfor, g pr. FE	4,9	4,9

Ab dyr, udskilt i alt:

	Tung race	Jersey
Mængde, ton	2,05	1,54
N, kg	22,1	16,6
P, kg	2,4	1,8
K, kg	14,3	10,7

Mængden ab lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Dybstrøelse (hele arealet)		Dybstrøelse	1,80	30,0	22,49	4,50	2,74	21,13	12,53	2,51	1,52	11,77
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv		Dybstrøelse	1,80	30,0	22,49	4,50	2,74	21,13	12,53	2,51	1,52	11,77

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, ud}) * 0,0562) + 1,48$ /1,82.

Årsopdræt, 0-6 mdr., småkalve, Jersey.
 Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt
 (småkalve) er beregnet på baggrund af 365
 foderdage

Mængden af lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	1,41	30,0	16,98	3,40	2,07	16,19	12,03	2,41	1,46	11,46
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	1,41	30,0	16,98	3,40	2,07	16,19	12,03	2,41	1,46	11,46

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, ud}) * 0,0433) + 1,14) / 1,4$.

Årsopdræt 6 mdr. til kælving (28 mdr.), kvier og stude, tung race.

Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er beregnet på baggrund af 365 foderdage.

Forudsætninger:

Antal FE	1783
Råprotein, g pr. FE	160
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,9

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	5,27 ton
N	38,8 kg
P	7,2 kg
K	42,1 kg

Mængden ab lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning		Staldgødning	4,34	18,2	18,33	4,58	6,70	16,23	4,22	1,06	1,54	3,74
		Ajle	2,83	3,4	16,24	14,61	0,65	28,55	5,74	5,17	0,23	10,10
Bindestald m. riste		Gylle	6,91	12,3	37,73	22,64	7,35	44,78	5,46	3,28	1,06	6,48
Sengestald m. fast gulv		Gylle	6,91	12,3	35,15	21,09	7,35	44,78	5,09	3,05	1,06	6,48
Sengestald m. spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)		Gylle	6,91	12,3	36,55	21,93	7,35	44,78	5,29	3,17	1,06	6,48
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, bagskyl)		Gylle	6,91	12,3	35,85	21,51	7,35	44,78	5,19	3,11	1,06	6,48
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, ringkanal)		Gylle	6,91	12,3	35,85	21,51	7,35	44,78	5,19	3,11	1,06	6,48
Dybstrøelse (hele arealet)		Dybstrøelse	5,70	30,0	42,53	8,51	8,22	63,65	7,46	1,49	1,44	11,16
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv		Dybstrøelse	5,02	30,0	41,35	8,27	8,05	60,06	8,24	1,65	1,60	11,96
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv		Dybstrøelse	4,38	30,0	27,18	5,44	5,16	43,22	6,20	1,24	1,18	9,87
		Gylle	2,46	11,0	13,70	8,22	2,89	16,84	5,57	3,34	1,18	6,85
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)		Dybstrøelse	4,38	30,0	27,18	5,44	5,16	43,22	6,20	1,24	1,18	9,87
		Gylle	2,46	11,0	14,26	8,56	2,89	16,84	5,80	3,48	1,18	6,85
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)		Dybstrøelse	4,38	30,0	27,18	5,44	5,16	43,22	6,20	1,24	1,18	9,87
		Gylle	2,46	11,0	13,98	8,39	2,89	16,84	5,69	3,41	1,18	6,85
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)		Dybstrøelse	4,38	30,0	27,18	5,44	5,16	43,22	6,20	1,24	1,18	9,87
		Gylle	2,46	11,0	13,98	8,39	2,89	16,84	5,69	3,41	1,18	6,85
Trædeudmugning		Gylle	12,55	10,0	37,94	22,76	7,64	51,07	3,02	1,81	0,61	4,07
Spaltegulvbokse		Gylle	6,76	10,0	34,96	20,97	7,22	42,09	5,17	3,10	1,07	6,22

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(((\text{alder, ind} + \text{alder, ud}) * 0,0562) + 1,48)/3,39$.

Årsopdræt, 6 mdr. til kælvning (25 mdr.), kvier og stude, Jersey.

Gødningsproduktionen fra 1 stk. årsopdræt er beregnet på baggrund af 365 foderdage.

Forudsætninger:

Antal FE	1337
Råprotein, g pr. FE	160
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,9

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	3,95 ton
N	29,1 kg
P	5,4 kg
K	31,6 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	3,21	18,6	13,91	3,48	5,03	12,43	4,33	1,08	1,57	3,87
	Ajle	2,31	3,1	12,02	10,81	0,48	21,23	5,21	4,69	0,21	9,21
Bindestald m. riste	Gylle	5,05	12,7	28,32	16,99	5,51	33,65	5,61	3,36	1,09	6,66
Sengestald m. fast gulv	Gylle	5,05	12,7	26,38	15,83	5,51	33,65	5,22	3,13	1,09	6,66
Sengestald m. spaltegulv (0,4 m kanal, linespil)	Gylle	5,05	12,7	27,44	16,46	5,51	33,65	5,43	3,26	1,09	6,66
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, bagskyl)	Gylle	5,05	12,7	26,91	16,15	5,51	33,65	5,33	3,20	1,09	6,66
Sengestald m. spaltegulv (1,2 m kanal, ringkanal)	Gylle	5,05	12,7	26,91	16,15	5,51	33,65	5,33	3,20	1,09	6,66
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	4,51	30,0	32,30	6,46	6,22	48,95	7,16	1,43	1,38	10,86
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	3,85	30,0	31,15	6,23	6,06	45,47	8,10	1,62	1,58	11,82
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	3,37	30,0	20,52	4,10	3,89	32,84	6,10	1,22	1,16	9,76
	Gylle	1,95	10,4	10,28	6,17	2,17	12,63	5,27	3,16	1,11	6,47
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	3,37	30,0	20,52	4,10	3,89	32,84	6,10	1,22	1,16	9,76
	Gylle	1,95	10,4	10,70	6,42	2,17	12,63	5,48	3,29	1,11	6,47
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	3,37	30,0	20,52	4,10	3,89	32,84	6,10	1,22	1,16	9,76
	Gylle	1,95	10,4	10,49	6,29	2,17	12,63	5,38	3,23	1,11	6,47
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	3,37	30,0	20,52	4,10	3,89	32,84	6,10	1,22	1,16	9,76
	Gylle	1,95	10,4	10,49	6,29	2,17	12,63	5,38	3,23	1,11	6,47
Trædeudmugning	Gylle	9,55	10,0	28,53	17,12	5,74	38,52	2,99	1,79	0,60	4,03
Spaltegulvbokse	Gylle	5,07	10,0	26,22	15,73	5,42	31,57	5,17	3,10	1,07	6,22

Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.):

Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: (((alder, ind + alder, ud) * 0,0433) + 1,14)/2,5.

**1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr.,
tung race**

Forudsætninger:

	Tung race
Antal FE	619
Råprotein, g pr. FE	169
Ford. råprotein, g pr. FE	127
Fosfor, g pr. FE	4,4
Indgangsvægt, kg	40
Afgangsvægt, kg	220
Tilvækst, kg pr. mdr.	30

Ab dyr, udskilt i alt:

	Tung race
Mængde, ton	1,28
N, kg	11,6
P, kg	1,2
K, kg	8,9

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	0,96	30,0	11,76	2,35	1,36	12,34	12,28	2,46	1,42	12,88
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	0,96	30,0	11,76	2,35	1,36	12,34	12,28	2,46	1,42	12,88

Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg):

$$(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2))/612$$

Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning:

for kvælstof: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285))/11,6$

for fosfor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g fosfor pr. FE}/1000 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085))/1,2$

1 produceret tyrekalv, 0-6 mdr., Jersey

Forudsætninger:

	Jersey
Antal FE	442
Råprotein, g pr. FE	169
Ford. råprotein, g pr. FE	127
Fosfor, g pr. FE	4,4
Indgangsvægt, kg	25
Afgangsvægt, kg	145
Tilvækst, kg pr. mdr.	20

Ab dyr, udskilt i alt:

	Jersey
Mængde, ton	0,91
N, kg	9,2
P, kg	1,0
K, kg	6,7

Mængden ab lager	Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
					Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Dybstrøelse (hele arealet)		Dybstrøelse	0,74	30,0	9,27	1,85	1,15	9,46	12,53	2,51	1,56	12,78
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv		Dybstrøelse	0,74	30,0	9,27	1,85	1,15	9,46	12,53	2,51	1,56	12,78

Korrektion for afvigende indgangs- og/eller afgangsvægt (kg):

$$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2))/415$$

Korrektion for afvigende tilvækst, fodermængde og sammensætning:

for kvælstof: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285))/9,2$

for fosfor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g fosfor pr. FE}/1000 - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085))/1,0$

Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (440 kg),
tung race, (1 produceret ungtyr)

Forudsætninger:

Tilvækst, kg	220
Antal FE	1280
Råprotein, g pr. FE	145
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,2
Indgangsvægt, kg	220
Afgangsvægt, kg	440
Tilvækst, kg pr. mdr.	33

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	2,82 ton
N	24,3 kg
P	3,8 kg
K	12,4kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	1,97	20,6	12,16	3,04	3,54	7,13	6,18	1,55	1,80	3,63
	Ajle	1,43	3,1	9,39	8,45	0,34	7,11	6,57	5,91	0,24	4,97
Bindestald m. riste	Gylle	3,40	12,8	23,65	14,19	3,88	14,24	6,97	4,18	1,14	4,19
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	3,60	30,0	27,15	5,43	4,48	27,37	7,54	1,51	1,25	7,60
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	3,12	30,0	26,33	5,27	4,37	24,87	8,43	1,69	1,40	7,96
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	2,83	30,0	17,45	3,49	2,85	19,92	6,17	1,23	1,01	7,05
	Gylle	1,41	8,9	8,58	5,15	1,52	4,94	6,08	3,65	1,08	3,51
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	2,83	30,0	17,45	3,49	2,85	19,92	6,17	1,23	1,01	7,05
	Gylle	1,41	8,9	8,96	5,38	1,52	4,94	6,35	3,81	1,08	3,51
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	2,83	30,0	17,45	3,49	2,85	19,92	6,17	1,23	1,01	7,05
	Gylle	1,41	8,9	8,77	5,26	1,52	4,94	6,22	3,73	1,08	3,51
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	2,83	30,0	17,45	3,49	2,85	19,92	6,17	1,23	1,01	7,05
	Gylle	1,41	8,9	8,77	5,26	1,52	4,94	6,22	3,73	1,08	3,51
Trædeudmugning	Gylle	7,17	10,0	24,00	14,40	4,08	18,61	3,35	2,01	0,57	2,60
Spaltegulvbokse	Gylle	3,11	10,1	21,92	13,15	3,79	12,36	7,06	4,23	1,22	3,98

Korrektion for afvigende afgangsvægt. Der korrigeres med følgende faktor:

$$(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2))/1280$$

Korrektion af N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245))/24,3$$

Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g P}/\text{FE}/1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072))/3,8$$

Ungtyre, 6 mdr. til slagtning (328 kg) Jersey,
(1 prod. ungtyr)

Forudsætninger:

Tilvækst, kg	183
Antal FE	1008
Råprotein, g pr. FE	145
Ford. råprotein, g pr. FE	105
Fosfor, g pr. FE	4,2
Indgangsvægt, kg	145
Afgangsvægt, kg	328
Tilvækst, kg pr. mdr.	28

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	2,22 ton
N	17,8 kg
P	2,7 kg
K	9,2 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	1,43	21,2	7,95	1,99	2,52	4,97	5,56	1,39	1,77	3,48
	Ajle	1,20	3,1	7,86	7,07	0,25	5,51	6,56	5,90	0,21	4,60
Bindestald m. riste	Gylle	3,03	10,8	17,24	10,34	2,77	10,48	5,68	3,41	0,91	3,46
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	2,49	30,0	19,55	3,91	3,18	19,24	7,85	1,57	1,28	7,73
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	2,49	30,0	19,55	3,91	3,18	19,24	7,85	1,57	1,28	7,73
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	1,78	30,0	12,22	2,44	1,97	13,05	6,87	1,37	1,11	7,33
	Gylle	1,18	8,4	6,24	3,74	1,09	3,69	5,31	3,18	0,92	3,14
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	1,78	30,0	12,22	2,44	1,97	13,05	6,87	1,37	1,11	7,33
	Gylle	1,18	8,4	6,53	3,92	1,09	3,69	5,55	3,33	0,92	3,14
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	1,78	30,0	12,22	2,44	1,97	13,05	6,87	1,37	1,11	7,33
	Gylle	1,18	8,4	6,39	3,83	1,09	3,69	5,43	3,26	0,92	3,14
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	1,78	30,0	12,22	2,44	1,97	13,05	6,87	1,37	1,11	7,33
	Gylle	1,18	8,4	6,39	3,83	1,09	3,69	5,43	3,26	0,92	3,14
Trædeudmugning	Gylle	6,50	10,0	18,05	10,83	3,00	15,49	2,78	1,67	0,46	2,38
Spaltegulvbokse	Gylle	2,52	9,8	15,97	9,58	2,71	9,23	6,34	3,80	1,08	3,66

Korrektion for afvigende afgangsvægt. Der korrigeres med følgende faktor:

$$(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2) / 1008$$

Korrektion for N-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 17,8$$

Korrektion af P-mængde ved afvigende tilvækst, fodermængde og -sammensætning. Der korrigeres med følgende faktor:

$$((\text{FE pr. prod. tyr 6 mdr. til afgang} \times \text{g P/FE} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,7$$

(Mængde og koncentrationer er rettet den 27-11-2007)

Ammekøer, 1 årsko under 400 kg

Forudsætninger:

Antal FE	1525
Råprotein, g pr. FE	207
Ford. råprotein, g pr. FE	151
Fosfor, g pr. FE	3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	5,08 ton
N	43,5 kg
P	4,1 kg
K	44,0 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning ¹⁾	Tørstof, pct. ²⁾	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	2,61	22,8	14,50	3,63	3,66	10,25	5,57	1,39	1,41	3,93
	Ajle	2,86	3,8	24,24	21,82	0,47	35,07	8,48	7,64	0,17	12,28
Bindestald m. riste	Gylle	5,50	12,1	41,57	24,94	4,14	45,32	7,55	4,53	0,75	8,23
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	6,99	30,0	44,19	8,84	4,70	57,57	6,32	1,26	0,67	8,24
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	6,42	30,0	43,63	8,73	4,62	55,87	6,80	1,36	0,72	8,71
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,19	5,44	2,92	36,59	5,57	1,11	0,60	7,50
	Gylle	3,35	6,9	15,27	9,16	1,63	17,58	4,56	2,73	0,49	5,25
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,19	5,44	2,92	36,59	5,57	1,11	0,60	7,50
	Gylle	3,35	6,9	15,98	9,59	1,63	17,58	4,77	2,86	0,49	5,25
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,19	5,44	2,92	36,59	5,57	1,11	0,60	7,50
	Gylle	3,35	6,9	15,63	9,38	1,63	17,58	4,66	2,80	0,49	5,25
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	4,88	30,0	27,19	5,44	2,92	36,59	5,57	1,11	0,60	7,50
	Gylle	3,35	6,9	15,63	9,38	1,63	17,58	4,66	2,80	0,49	5,25
Trædeudmugning	Gylle	10,24	11,0	41,89	25,13	4,47	52,47	4,09	2,45	0,44	5,12

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 7,0) / 43,5$$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 1,4) / 4,1$$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden.

(Mængde og koncentrationer er rettet den 27-11-2007)

Ammekøer, 1 årsko 400-600 kg

Forudsætninger:

Antal FE	2207
Råprotein, g pr. FE	207
Ford. råprotein, g pr. FE	151
Fosfor, g pr. FE	3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	7,35 ton
N	63,3 kg
P	6,0 kg
K	63,8 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning ¹⁾	Tørstof, pct. ²⁾	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	3,72	22,8	20,59	5,15	5,30	14,22	5,53	1,38	1,42	3,82
	Ajle	4,17	3,8	35,87	32,28	0,73	51,37	8,59	7,73	0,18	12,31
Bindestald m. riste	Gylle	7,88	12,1	60,50	36,30	6,03	65,59	7,68	4,61	0,77	8,32
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,59	30,0	63,82	12,76	6,79	81,93	6,65	1,33	0,71	8,54
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	8,83	30,0	63,07	12,61	6,68	79,66	7,14	1,43	0,76	9,02
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	6,67	30,0	39,19	7,84	4,20	51,88	5,88	1,18	0,63	7,78
	Gylle	4,85	6,9	22,24	13,35	2,38	25,51	4,59	2,75	0,49	5,26
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	6,67	30,0	39,19	7,84	4,20	51,88	5,88	1,18	0,63	7,78
	Gylle	4,85	6,9	23,27	13,96	2,38	25,51	4,80	2,88	0,49	5,26
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	6,67	30,0	39,19	7,84	4,20	51,88	5,88	1,18	0,63	7,78
	Gylle	4,85	6,9	22,76	13,65	2,38	25,51	4,69	2,82	0,49	5,26
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	6,67	30,0	39,19	7,84	4,20	51,88	5,88	1,18	0,63	7,78
	Gylle	4,85	6,9	22,76	13,65	2,38	25,51	4,69	2,82	0,49	5,26
Trædeudmugning	Gylle	14,25	11,0	60,66	36,40	6,47	75,12	4,26	2,55	0,45	5,27

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 9,6) / 63,3$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 2,0) / 6,0$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden.

(Mængde og koncentrationer er rettet den 27-11-2007)

Ammekøer, 1 årsko over 600 kg

Forudsætninger:

Antal FE	2502
Råprotein, g pr. FE	207
Ford. råprotein, g pr. FE	151
Fosfor, g pr. FE	3,6

Ab dyr, udskilt i alt:

Mængde	8,3 ton
N	72,0 kg
P	6,8 kg
K	72,4 kg

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning ¹⁾	Tørstof, pct. ²⁾	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Bindestald m. grebning	Staldgødning	4,15	22,8	22,65	5,66	5,94	15,15	5,46	1,37	1,43	3,66
	Ajle	4,80	3,8	41,60	37,44	0,92	59,09	8,67	7,81	0,19	12,32
Bindestald m. riste	Gylle	8,81	12,1	68,76	41,25	6,86	74,24	7,81	4,69	0,78	8,43
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	10,06	30,0	71,80	14,36	7,61	90,58	7,14	1,43	0,76	9,01
Dybstrøelse + kort ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	9,30	30,0	71,05	14,21	7,51	88,31	7,64	1,53	0,81	9,50
Dybstrøelse + lang ædeplads, fast gulv	Dybstrøelse	6,95	30,0	43,98	8,80	4,69	57,07	6,33	1,27	0,68	8,21
	Gylle	5,50	6,9	25,31	15,18	2,71	28,97	4,60	2,76	0,49	5,27
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (0,4 m kanal, linespil)	Dybstrøelse	6,95	30,0	43,98	8,80	4,69	57,07	6,33	1,27	0,68	8,21
	Gylle	5,50	6,9	26,48	15,89	2,71	28,97	4,82	2,89	0,49	5,27
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m kanal, bagskyl)	Dybstrøelse	6,95	30,0	43,98	8,80	4,69	57,07	6,33	1,27	0,68	8,21
	Gylle	5,50	6,9	25,89	15,54	2,71	28,97	4,71	2,83	0,49	5,27
Dybstrøelse + lang ædeplads, spalter (1,2 m ringkanal)	Dybstrøelse	6,95	30,0	43,98	8,80	4,69	57,07	6,33	1,27	0,68	8,21
	Gylle	5,50	6,9	25,89	15,54	2,71	28,97	4,71	2,83	0,49	5,27
Trædeudmugning	Gylle	15,27	11,0	68,50	41,10	7,30	83,77	4,49	2,69	0,48	5,49

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g råprotein pr FE}/6250) - 10,7) / 72,0$

Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

$((\text{FE pr årsko} * \text{g P pr FE}/1000) - 2,2) / 6,8$

¹⁾ Gødning afsat under afgræsning regnes som afsat på stald. Lagerbehov kan estimeres på baggrund af antal dage på stald.

²⁾ Tørstofprocent for den del af gødningen, som afsættes på stald i vinterperioden.

Slagtefjerkræ

Forudsætninger	Foder pr. produc. dyr, kg	Tilvækst, kg	Protein i foder, pct.	Fosfor i foder, pct.	Kalium i foder, pct.	Ab dyr, udskilt i alt		
						N kg	P kg	K kg
1000 slagtekyllinger, 30 dage	2,26	1,46	20,8	0,60	0,80	33,3	3,80	14,0
1000 slagtekyllinger, 32 dage	2,59	1,62	20,6	0,60	0,80	38,9	4,73	16,2
1000 slagtekyllinger, 35 dage	3,22	1,92	20,3	0,59	0,80	49,4	6,16	20,4
1000 slagtekyllinger, 40 dage	4,15	2,36	19,9	0,58	0,80	64,2	8,26	26,6
1000 slagtekyllinger, 45 dage	5,01	2,77	19,6	0,57	0,80	77,2	9,97	32,3
Skrabekyllinger, 1000 prod., 56 dage	5,52	2,40	15,0	0,69	0,70	63,4	22,0	31,9
Økologiske kyllinger, 1000 prod., 81 dage	6,99	2,15	16,9	0,69	0,70	127,0	33,8	42,9
100 kalkuner, tunge, hanner	50,7	19,1	17,6	0,71	0,77	87,8	23,2	33,7
100 kalkuner, tunge, hunner	24,3	9,7	19,6	0,79	0,84	48,1	12,7	17,7
100 ænder	9,75	3,73	16,8	0,65	0,75	17,3	4,29	6,45
100 gæs	28,0	6,5	16,0	0,70	0,60	56,1	16,0	15,3

Slagtekyllinger, 1000 stk.

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²) 30 dage	Dybstrøelse	1,15	48,0	22,92	6,88	3,86	15,27	20,01	6,00	3,37	13,33
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²) 32 dage	Dybstrøelse	1,29	48,0	26,74	8,02	4,79	17,48	20,70	6,21	3,71	13,53
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²) 35 dage	Dybstrøelse	1,57	48,0	33,81	10,14	6,21	21,64	21,57	6,47	3,96	13,81
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²) 40 dage	Dybstrøelse	1,98	48,0	43,87	13,16	8,32	27,87	22,15	6,65	4,20	14,08
Slagtekyllinger (25 dyr/m ²) 45 dage	Dybstrøelse	2,36	48,0	52,66	15,80	10,03	33,54	22,35	6,71	4,26	14,24
Skrabekyllinger (10 dyr/m ²) 56 dage	Dybstrøelse	2,73	48,0	40,97	12,29	22,12	34,43	15,01	4,50	8,10	12,61
Økologiske slagtekyllinger m. friareal (10 dyr/m ²) 81 dage	Dybstrøelse	4,78	50,0	78,03	23,41	31,30	57,42	16,32	4,90	6,55	12,01
	Udeareal	0,36	50,0	12,70	0,00	3,38	4,29	35,62	0,00	9,48	12,03

Slagtefjerkrae, 100 stk.

Mængden ab lager		Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
Staldsystem	Gødningstype			Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Kalkuner tunge, hunner	Dybstrøelse	1,12	48,0	31,77	9,53	12,69	18,41	28,46	8,54	11,37	16,49
Kalkuner tunge, hanner	Dybstrøelse	2,24	48,0	57,82	17,35	23,25	34,43	25,81	7,74	10,38	15,37
Ænder	Dybstrøelse	1,05	35,0	12,19	3,66	4,43	9,59	11,56	3,47	4,20	9,09
Gæs	Dybstrøelse	2,12	35,0	37,66	11,30	16,17	18,44	17,77	5,33	7,63	8,70

Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning:

Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor (pr. 1000 slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs):

Slagtekyllinger, 30 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/33,3$
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/38,9$
Slagtekyllinger, 35 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/49,4$
Slagtekyllinger, 40 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/64,2$
Slagtekyllinger, 45 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/77,2$
Skrabekyllinger, 56 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/63,4$
Øko. kyllinger, 81 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{prot. pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8))/127,0$
Kalkuner, hunner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/48,1$
Kalkuner, hanner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/87,8$
Ænder	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 2,4))/17,3$
Gæs	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 2,4))/56,1$

Fosformængden korrigeres med følgende faktor (pr. 1000 slagtekyllinger; pr. 100 kalkuner, ænder, gæs):

Slagtekyllinger, 30 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/3,80$
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/4,73$
Slagtekyllinger, 35 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/6,16$
Slagtekyllinger, 40 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/8,26$
Slagtekyllinger, 45 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/9,97$
Skrabekyllinger, 56 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/22,0$
Øko. kyllinger, 81 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{pct. fosfor i foder} \times 10) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 6,7))/33,8$
Kalkuner, hunner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,67))/12,7$
Kalkuner, hanner	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,67))/23,2$
Ænder	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,55))/4,29$
Gæs	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,55))/16,0$

Høns og hønniker

Forudsætninger	Produktionstid, dage	Tilvækst pr. årshøne/hønnike, kg	Æg prod. pr. årshøne, kg	Foder pr. årshøne, kg	Protein i foder	Fosfor i foder, pct.	Kalium i foder, pct.	Ab dyr, udskilt i alt			
								Mængde ton	N kg	P kg	K kg
Konsumægshøner, bur, 100 årshøner	-	0,65	18,7	40,8	17,4	0,55	0,70	4,49	77,9	18,3	25,9
Skrabehøner, 100 årshøner	-	0,65	17,8	45,0	17,4	0,55	0,70	4,95	91,2	20,8	29,0
Fritgående høner, 100 årshøner	-	0,65	16,9	45,8	17,4	0,55	0,70	5,04	95,0	21,4	29,7
Økologiske høner, 100 årshøner	-	0,65	16,8	48,1	17,4	0,55	0,70	5,29	101,6	22,7	31,3
HPR-høner, 100 årshøner	-	1,6	11,9	53,9	15,3	0,52	0,71	5,93	105,8	24,6	36,3
Hønniker, konsumæg, 100 producerede	112	1,35	-	5,3	16,0	0,70	0,65	0,54	9,7	2,8	3,07
Hønniker, HPR, 100 producerede	119	1,7	-	7,5	16,0	0,60	0,60	0,77	14,3	3,4	4,02

1 årshøne er defineret til at modsvare 365 foderdage

Høns og hønniker, 100 stk.

Mængden ab lager Staldsystem	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof, pct.	Indhold i alt				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Konsumæg, gulvdrift + gødningskumme+udeareal, fritgående	Dybstrøelse	0,54	63,3	18,34	5,50	6,41	8,90	33,86	10,16	11,84	16,44
	Staldgødning	1,90	40,0	29,08	10,18	12,82	17,81	15,27	5,35	6,73	9,35
	Udeareal	0,50	28,0	9,50	0,00	2,14	2,97	18,87	0,00	4,24	5,89
Konsumæg, gulvdrift + uden gødningskumme +udeareal, fritgående	Dybstrøelse	1,62	63,3	55,01	16,50	19,24	26,71	33,86	10,16	11,84	16,44
	Staldgødning	0,00	40,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udeareal	0,50	28,0	9,50	0,00	2,14	2,97	18,87	0,00	4,24	5,89
Konsumæg, gulvdrift + gødningskumme+udeareal, økologiske	Dybstrøelse	0,57	63,3	19,61	5,88	6,80	9,39	34,48	10,34	11,95	16,51
	Staldgødning	2,00	40,0	31,10	10,88	13,60	18,78	15,55	5,44	6,80	9,39
	Udeareal	0,53	28,0	10,16	0,00	2,27	3,13	19,21	0,00	4,28	5,92
Konsumæg, gulvdrift + udeareal, økologiske	Dybstrøelse	1,76	63,3	56,65	17,00	20,42	28,80	32,18	9,65	11,60	16,36
	Udeareal	0,53	28,0	10,16	0,00	2,27	3,13	19,21	0,00	4,28	5,92
Konsumæg, gulvdrift + gødningskumme, skrabeheøner	Dybstrøelse	0,60	63,3	19,40	5,82	6,86	9,72	32,42	9,73	11,46	16,25
	Staldgødning	2,09	40,0	31,16	10,91	13,91	19,43	14,91	5,22	6,66	9,30
Konsumæg, voliere m. gød- ningsbånd, skrabeheøner	Dybstrøelse	0,46	63,3	14,71	4,41	5,20	7,40	32,22	9,67	11,38	16,22
	Staldgødning	2,34	40,0	52,32	18,31	15,57	21,75	22,37	7,83	6,66	9,30
Konsumæg, bure m. gødnings- kælder	Staldgødning	2,83	40,0	58,25	20,39	18,26	25,95	20,60	7,21	6,46	9,18
Konsumæg, bure m. bånd	Staldgødning	2,83	40,0	59,57	20,85	18,26	25,95	21,07	7,37	6,46	9,18
Konsumæg, bure m. bånd	Gylle	9,95	12,0	68,68	44,64	18,26	25,95	6,90	4,49	1,84	2,61
Rugeæg, gulvdrift + gødningskumme, HPR	Dybstrøelse	1,45	63,3	45,68	13,70	16,48	24,62	31,49	9,45	11,36	16,97
	Staldgødning	1,23	40,0	17,81	6,23	8,11	11,97	14,45	5,06	6,58	9,71
Hønniker, konsum, netdrift, 112 dage	Staldgødning	0,30	40,0	4,94	1,73	2,81	3,07	16,22	5,68	9,22	10,08
Hønniker, konsum, gulvdrift, 112 dage	Dybstrøelse	0,26	48,0	6,67	2,00	2,82	3,38	25,24	7,57	10,68	12,80
Hønniker, rugeæg, HPR, gulv- drift, 119 dage	Dybstrøelse	0,36	48,0	9,80	2,94	3,38	4,34	27,32	8,20	9,41	12,09

Korrektion for afvigende fodermængde og sammensætning (pr. 100 årshøns/100 producerede hønniker)

Kvælstofmængden korrigeres med følgende faktor:

Fritgående høns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88))/95,0
 Økologiske høns ((kg foder pr. årshøne x prot. pct. i foder x 0,16) - (kg æg pr. årshøne x 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne x 2,88))/101,6

Skrabehøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/91,2$
Burhøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/77,9$
HPR-høner	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/105,8$
Hønniker, konsum	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88))/9,7$
Hønniker, HPR	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{prot. pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88))/14,3$

Fosformængden korrigeres med følgende faktor:

Fritgående høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67))/21,4$
Økologiske høns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67))/22,7$
Skrabehøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67))/20,8$
Burhøns	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67))/18,3$
HPR-høner	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67))/24,6$
Hønniker, konsum	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,67))/2,8$
Hønniker, HPR.	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{pct. fosfor i foder}) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,67))/3,4$

Pelsdyr

Forudsætninger (mink) 5,36 hvalpe (skind) pr. årstæve 214,1 kg foder/årstæve (39,9 kg foder pr. produceret skind)	Ab dyr, udskilt i alt			
	Mængde, ton	Kg N	Kg P	Kg K
Mink, 1 årstæve	0,20	5,17	0,93	0,50
Ræve + finnraccoon, 1 årstæve	0,45	12,9	2,32	1,25

Staldsystem	Gødningstype	Ton* gødning	Tørstof* pct.	Indhold i alt ab lager				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K
Mink, bure gødningsrende (ugentlig tømning)	Gylle	0,41	6,5	2,56	1,79	0,93	0,56	6,28	4,40	2,29	1,38
Mink, bure, fast gødning i gødningsrende	Gylle	0,21	12,0	2,14	0,96	0,93	0,56	10,25	4,61	4,47	2,70
Mink, bure (grusbund)	Staldgødning	0,10	25,0	1,10	0,49	0,54	0,15	10,93	4,92	5,35	1,53
Ræve og finnraccoon (grusbund)	Staldgødning	0,17	25,0	2,71	1,22	1,34	0,29	16,00	7,20	7,88	1,70

*) ekskl. sand

Mink

Korrektion af mængden af kvælstof, fosfor og kalium ved ændret foderforbrug pr. årstæve:

Mængden af kvælstof, fosfor og kalium korrigeres med følgende faktor: kg foder pr. årstæve/214,1

1 voksen årshest

	FE pr. dag	Ford. råprot. pr. FE
Heste, 200 kg (under 300 kg)	3,1	80
Heste, 400 kg (300-500 kg)	5,2	80
Heste, 600 kg (500-700 kg)	7,0	80
Heste, 800 kg (over 700 kg)	8,8	80

Ab dyr, udskilt i alt	200 kg	400 kg	600 kg	800 kg
Mængde, ton	2,4	2,9	4,4	5,8
N, kg	23,0	38,0	50,0	63,0
P, kg	4,0	6,0	8,0	10,0
K, kg	21,0	35,0	46,0	58,0

Vægtklasse	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt ab lager				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ N	Kg P	Kg K
Heste, 200 kg (under 300 kg)	Dybstrøelse	2,97	26,0	21,06	5,26	4,63	34,73	7,10	1,77	1,56	11,70
Heste, 400 kg (300-500 kg)	Dybstrøelse	4,52	26,0	34,85	8,71	7,05	57,89	7,72	1,93	1,56	12,82
Heste, 600 kg (500-700 kg)	Dybstrøelse	5,13	26,0	43,72	10,93	9,05	68,89	8,52	2,13	1,76	13,42
Heste, 800 kg (over 700 kg)	Dybstrøelse	5,75	26,0	53,34	13,33	11,05	80,89	9,27	2,32	1,92	14,06

Årsmoderfår med lam / 1 ged med kid

Forudsætninger			Ab dyr, udskilt i alt		
	Foderforbrug, FE	Gødningsmængde, ton	N, kg	P, kg	K, kg
Får	728	2,29	17,0	2,81	29,3
Mohairgeder	603	2,02	12,8	1,87	18,1
Kødgeder	667	2,11	16,4	2,32	26,4
Malkegeder	669	2,23	17,0	2,86	19,5

	Gødningstype	Ton gødning	Tørstof pct.	Indhold i alt ab lager				Indhold pr. ton gødning			
				Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K	Kg N	Kg NH ₄ -N	Kg P	Kg K
Moderfår med lam	Dybstrøelse	1,16	34,6	14,57	3,64	3,13	36,16	12,53	3,13	2,69	31,10
Mohairged med kid	Dybstrøelse	1,11	34,6	11,52	2,88	2,19	25,00	10,35	2,59	1,97	22,47
Kødged med kid	Dybstrøelse	1,13	34,6	14,13	3,53	2,64	33,24	12,52	3,13	2,34	29,44
Malkeged med kid	Dybstrøelse	1,15	34,6	14,63	3,66	3,18	26,42	12,70	3,17	2,76	22,94