

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber

TEMA 2: Fodring sommer og vinter

- 2) Det er vigtigt, at køer på græs suppleres sideløbende med foder og goldkomineraler, enten
- ✓ De sidste 7-14 dage før kælvning
 - ✓ Eller: Hele afgræsningsperioden

Baggrund:

Sommer

Fodringen af goldkøer i sommerperioden, dels i forbindelse med afgræsning og dels i forbindelse med dagene op til kælvning, udviste variation. Der var forskellige metoder, men temaet kan deles i 3 undertemaer: Fodring de sidste 7-14 dage før kælvning, fodring sideløbende med afgræsning hele græsperioden og udelukkende afgræsning evt. plus goldkomineraler.

- a) Afgræsning indtil 7-14 dage før kælvning.

Afgræsning indtil 7-14 dage før forventet kælvning var en almindelig metode, men der var forskellige overvejelser herfor. En begrundede det med, at metoden var valgt i forhold til fodring. Han havde goldkøer på ekstensivt græs indtil 14 dage før kælvning:

Vi bestræber os på at få dem hjem 14 dage før kælvning, så får de den almindelige goldkoblanding. (3)

- b) Fodring sideløbende med afgræsning hele græsperioden.

Der var begrænset variation i valget af foder blandt de landmænd, der fodrede hele græsperioden. En af de landmænd, der fodrede hele afgræsningsperioden med, svarede:

Vi havde bygærtehelsæd indtil 1.juni i år cirka, så dertil kørte vi bare med den ration, som vi havde kørt med hele vinteren. Vi stoppede med helsæd der, fordi vi kunne se at vi nu havde så lille et forbrug. Så lukkede vi (stakken) ned, og gik vi over til majs, som vi har til de malkende køer og så græsensilage. Og lige nu er vi gået tilbage til bygærtehelsæd igen, for nu har vi brug for det. Men vi har dem altid inde på stald,

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber

når de andre (lakterende) køer er ude, og giver dem en ration, svarende til 5-7 FE, ligesom efter hvor meget græs vi synes der er på marken. (6)

c) Udelukkende afgræsning evt. plus goldkomineraler.

Kun ganske få landmænd praktiserede denne form for afgræsning, og der var ikke nogle begrundelse herfor. Det var en procedure, som landmændene havde foretaget gennem alle årene, og som passede til deres temperament:

Vi sætter goldkøerne over i "fårefold" 14 dage før med masser af mineraler. (4)

En af dem der havde udelukkende afgræsning sagde, at hans køer gik ude på græs, de fik udelukkende mineraler og han lod også køerne kælve ude. Han syntes dog ikke det var optimalt, men var den mulighed han havde:

Jamen jeg tænker jo, at de skal jo ud, og så tænker jeg nok at hvis stalden var sådan at de kunne gå ind og ud sådan som de ville, så ville det nok egentlig være det bedste, sådan det bare var en motionsfold de havde ude, men det synes jeg ikke lige at jeg kan stille an. (...) Og så skulle man fodre dem inden for sådan mest... (8)

Fra: Diskussionen

. De landmænd, som valgte at tage goldkøerne hjem 7-10 dage før kælving, lod køerne afgræsse på større områder, ofte ugødede arealer, og supplerede med goldkomineraler. Deres køer blev hentet hjem og sat på goldkofoder straks ved hjemtagelsen. Selvom rådgiverne anbefalede restriktiv afgræsning suppleret med goldkoblanding i hele afgræsningsperioden, var erfaringerne fra landmændene, at afgræsning på arealer uden kløver, og goldkofodring de sidste 7-14 dage før kælving, virker.

Fra: anbefalinger fra rådgiverne

Afgræsning af goldkøer:

- Undgå kløver i marken til goldkøer. Specielt de sidste 3 uger.
- Undgå for meget græs i hele perioden, - så de bliver for fede.

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber

- Gerne mark tæt på gården, - specielt de sidste 3 uger.
- Fodring sommer på samme måde som om vinteren, suppleret med afgræsning.
- Undgå at gøde marken.
- Begrænse antal FE i græs, og fodre med goldko foder ved siden af.