

Anbefalinger fra økologiske mælkeproducenter og deres rådgivere om forebyggelse af mælkefeber

- 
- 1) Ved sommerafgræsning er det vigtigt, at du lader goldkøerne græsse på en mark uden kløver, enten som
 - ✓ Restriktiv afgræsning
 - ✓ Ekstensiv afgræsning
 - 2) Det er vigtigt, at køer på græs suppleres sideløbende med foder og goldkomineraler, enten
 - ✓ De sidste 7-14 dage før kælvning
 - ✓ Eller: Hele afgræsningsperioden
 - 3) Det er vigtigt at du får lavet en goldko-foderplan, som mixes i fodervogn og tilpasses ved foderskift
 - ✓ Brug goldminerale af god kvalitet
 - ✓ Undgå bælgplanter
 - ✓ Begræns mængde af græsensilage, ved brug af gule fodermidler
 - 4) Du bør opstalde dine goldkøer under gode forhold
 - ✓ Der skal være god plads i kælvningsområdet
 - ✓ En ædeplads per goldko
 - ✓ Opstald kælvkvier og goldkøer i separate kælvningsområder
 - 5) Når køer skal flyttes, er det vigtigt, du undgår koen bliver stresset
 - ✓ Flytning enten 7-10 dage før kælvning eller så tæt på kælvning som muligt
 - ✓ Flyt minimum to køer ad gangen
 - 6) Kælvninger kan foregå såvel inde som ude, men kræver opsyn
 - ✓ Kig på koen
 - ✓ Lad koen kælte i et område, hvor du passerer mange gange dagligt
 - 7) Efter kælvning
 - ✓ Bør ko og kalv gå for sig selv i minimum 24 timer
 - ✓ Undlad at malke 3.kalvs og ældre de første 24 timer (evt. kun til kalven)
 - 8) Især ved ældre køer skal du være opmærksom på øget risiko for mælkefeber, og du kan med fordel tilbyde koen lunkent vand evt. med et kalcium produkt i, lige efter kælvning
 - ✓ Det er vigtigt at have rutinemæssig fokus på 3.kalvs køer og ældre med faste procedurer
 - 9) Du bør anvende huldvurderinger som grundlag for afgoldning tidspunkt. Du bør undgå
 - ✓ Fede køer
 - ✓ At køerne enten taber sig eller tager på i goldperioden